

No. 91. Situation des malades atteints d'abcès au fondement.

Les grands abcès au fondement font ordinairement perir les malades dans le marasme; Les moyens et les petits — deviennent très souvent sinueux et fistuleux. L'abondance des graisses qui avoisinent le rectum et le croûpissement du pus favorisent ces terminaisons. on ne fait communément pas assez d'attention à une des causes du croûpissement du pus; les malades sont ordinairement couchés sur le dos, ou sur un des côtés: M. Colombier dans sa médecine militaire fait un précepte de les faire coucher sur le côté, afin, dit-il, qu'il ne se fasse pas des compressions nuisibles sur la partie malade. Ces situations favorisent le croûpissement du pus, la destruction du tissu cellulaire, les sinus, la résorption du pus &c. La situation la plus favorable pour éviter, non seulement le croûpissement du pus et tous les mauvais effets qui en résultent, mais encore toute compression des parties — souffrantes, est celle où les malades sont assis sur un grand boursalet, ayant le dos légèrement penché en arrière, les cuisses et les jambes fléchies, et les jarrets soutenus par un traversin. par cette situation on guérira promptement et

ARC 56

n° 91

serement la plus grande partie des dépôts au fondement, si
l'on a attention de faire des incisions convenables et des pansements
methodiques. j'ai obtenu plusieurs succès heureux par ces
moyens, j'en citerai un des plus remarquables.

Le Homme Bernard fullereau furilles de la Comp^e de laeau,
du corps royal de la marine, entra a l'hôpital de la marine le
11^e janvier 1768 ayant le poulx febrile, se plaignant de rétention
d'urine et de douleurs profondes a la region du rectum. Les
boissons temperantes, les potions huileuses, les émulsions nitrées,
les saignées et les bains de siege réitérés, furent employés; les
lavemens ne pouvoient pas penetrer. tous ces remedes
procuroient peu de soulagement, ils favorisoient seulement
la sortie des urines, dont l'évacuation se fit de temps en temps
quoiqu'imparfaitement. il n'y avoit point de tumeur
apparente, mais au bout de peu de jours il parut un peu
de gonflement avec tension au côté droit de la marge de
l'anus; j'y fis appliquer des cataplasmes émolliens, et trois jours
après je parvins a reconnoître une fluctuation sourde et
profonde qui m'annonça une collection de pus. je me
hâtai de lui donner issue, je plongeai un bistouri dans
la partie postérieure et laterale droite du fondement, a
six lignes de la marge de l'anus; je fis une incision oblique

De derrière en devant et en dehors, qui donna issue à une
très grande quantité de pus; je portai le doigt indicateur
de la main droite dans l'ouverture que je venois de faire,
en le dirigeant le long du rectum que je trouvais dénudé,
je ne pus pas atteindre au fond de la cavité de l'abscès;
le dirigeant ensuite en devant, je trouvais que le vide
gagnoit vers le perinée. C'étoit un de ces cas où presque
tous les praticiens font une longue incision à côté de la
masse de l'anus, après laquelle quelques uns incisent
l'intestin et d'autres en emportent une portion. Je crus
devoir m'écarter des pratiques reçues. 1.^o une seule incision
ayant beaucoup d'étendue auroit trop isolé de la côté l'extrémité
inférieure du rectum. 2.^o L'incision de l'intestin auroit
été infructueuse, ne pouvant être prolongée jusqu'au
fond de la cavité de l'abscès. 3.^o la même raison m'empêchoit
d'emporter une portion de l'intestin, d'ailleurs cette excision
expose à des inconvénients qu'il est bon de prévenir. 4.^o une
seule petite ouverture comme prescrivait M. Foubert ne
me parut pas suffisante pour obvier au crampissement
de pus. voici ma conduite, je portai une sonde ébranlée

Dans la plaie, en la dirigeant vers le perinée, et par son
moyen, j'eus une contre ouverture a côté de la partie
antérieure de l'anus, je couvris d'un linge les deux plaies,
pour les laisser degorger, après quoi, j'les pansai simplement
avec un emplâtre d'onguent de la mere, qui n'adherant que
faiblement a leur circonférence n'opposoit point d'obstacle
a la sortie du pus. cet emplâtre fut couvert de deux
compreses maintenues par un bandage en X, j'eus garni
le lit du malade d'une alaise, je le fis asseoir sur un
grand bourselet de crin recouvert de marroquin, j'eus
placé un matelas roulé derrière son dos et un traversin
sous ses jarrets. aux pansements suivans, j'eus appliqué sur les
deux plaies, des plumaceaux garnis de digestif simple, et une
compresse expulsive au perinée, j'eus donné des lavemens
et administrés intérieurement le quinquina. la suppuration
abondante pendant quelques jours diminua: j'eus introduire
alors dans l'anus une très longue tige mollette enduite de
cerat de galien; la compresse expulsive fut continuée,
le quinquina supprimé, les plaies pansées a sec furent
conduites a cicatrice et le malade sortit de l'hôpital le 25. mars.
La manière dont je traite les malades qui ont des abcès au

fondement, dérivant du précepte général de donner aux parties malades la situation la plus favorable à l'évacuation du pus, ne m'auroit jamais paru mériter l'attention de l'Académie, si le précepte d'une situation différente n'étoit pas consigné dans un ouvrage moderne mis entre les mains des chirurgiens militaires par ordre du gouvernement. Les deux observations suivantes ne font non plus que l'application des préceptes généraux aux cas particuliers, j'en fais mention cependant pour faire connoître les ressources de la nature lorsqu'on la met à portée d'agir



utilité de la compression et de la situation dans les grands abcès compliqués de dénudation des os.

M. Martin ancien habitant de St. Domingue passant en France sur un corsaire, pendant l'avant-dernière guerre, fut blessé par un éclat de bois qui lui fit une plaie très considérable à la partie externe, supérieure presque moyenne de la cuisse droite et fractura le fémur. il fut pris et mené en Angleterre; son traitement fut long, on lui fit des incisions très considérables, dont il lui reste une cicatrice qui règne tout le long de la partie externe de la cuisse et qui est plus large à la partie supérieure presque moyenne, à l'endroit de la destruction de substance.

la cuisse est plus courte que l'autre de quatre travers de doigt,
la fracture n'ayant pas été réduite. Dans l'année 1765 il me
fit appeler à la liotat, ou il fait sa résidence; je le trouvais malade
depuis plusieurs jours d'un dépôt considérable, qui s'étoit ouvert
la veille, presque à la partie supérieure de l'écaille et d'où
étoit sortie une pus fétide et abondant. j'agrandis cette ouverture,
et j'eus une contreouverture à la partie inférieure de la cuisse,
toujours parties externes. en portant le doigt dans la plaie sup.
et le dirigeant vers le fémur, je trouvais cet os dénudé à
l'endroit de la réunion des deux pièces jadis séparées par la
fracture; je fus tenté de faire une incision à la partie antérieure
de la cuisse sur l'endroit où l'os étoit dénudé, mais je voulus
auparavant essayer de faire adhérer cette portion d'os avec les
chairs voisines, en les mettant en contact. Ce qui contribua
beaucoup à me faire prendre le parti, fut qu'ayant questionné
le malade, pour découvrir la cause de ce dépôt, il se rappela
d'avoir fait une chute sur le parquet de sa chambre, environ
un mois auparavant. Le premier pansement fut fait à sec;
dans les deux suivans, je fis des injections avec la decoction
de quinquina et de fleurs de camomille, j'appliquai des
plumaceaux garnis de digestif simple sur les plaies, j'e-

mis de la charpie boute sur la partie antérieure de la cuisse qui
repondoit a une gouttiere osseuse formée par la soudure des
deux pieces de l'os jadis fracturé, laquelle étoit dénudée: je
la couvris d'une compresse expulsiue, j'en placai une autre entre
les deux incisions, je couvris toute la cuisse excepté la partie externe
d'une troisième compresse épaisse: j'en enveloppai toute la cuisse,
le genou et la partie supérieure de la jambe de plusieurs
morceaux de bandes larges, dont j'appliquois la partie moyenne
sur la partie interne de la cuisse, du genou et de la partie supérieure
de la jambe, et dont je couvrois obliquement les extrémités
sur la partie externe; j'afixai les extrémités les plus supérieures
a une bande passée autour du corps, je situai la partie de manière
que le pus eut sa pente vers les incisions et qu'il put s'échapper
a mesure qu'il se formoit. j'avis le malade a l'usage de quatre
prises de decoction de quinquina par jour. je supprimai les
injections le quatorzième jour. alors la cuisse pouvoit être foulée
plus facilement, après l'application de la charpie et des compresses
expulsiues, j'employai deux bandes roulées, avec une desquelles
je fis deux circulaires autour du corps, dont je descendis sur la
partie supérieure de la cuisse que j'entourai par des doctins et
des renversés, jusqu'à la partie moyenne: ~~bandes~~ —

j'employai l'autre dans un sens contraire, c'est à dire qu'après avoir fait deux circulaires autour de la partie supérieure de la jambe, je montai par des doloires et des renversés jusqu'à la partie moyenne de la cuisse, à l'endroit où j'avois fini les circonvolutions de la première. le huitième jour, la suppuration étoit louable, et peu abondante, et la cuisse sans tumeur: je quittai le malade en recommandant à son chirurgien ordinaire de continuer les pansements de la même manière.

huit jours après, on m'envoya chercher, j'eus la suppuration copieuse et sereuse, les chairs pales et molles, et la cuisse tumefiée et œdémateuse. j'appris que le chirurgien ordinaire n'avoit eu aucun égard à mes avis, que ma jeunesse lui fit peut être mépriser, et qu'il avoit entièrement négligé la compression, pensant à sa fantaisie. je ne désespérai pas de réussir encore par la compression, ayant affaire à un homme sain d'ailleurs, d'un bon tempérament et à la fleur de son âge. M. huet chirurgien aide major de la marine, professeur démonstrateur royal du collège de chirurgie de toulon, qui fut appelé en consultation fut d'avis de pratiquer encore la compression — avant de tenter d'autres moyens. je recommençai à panser de la même manière qu'avant mon départ: j'eus la satisfaction de voir dans peu de jours, l'œdème disparaître, la suppuration diminuer et redevenir louable, et enfin au bout de vingt jours de

pansements methodiques, je laisai le malade n'ayant besoin que d'un peu de charpie seche qu'il appliquoit lui meme sur une de ses plaies, qui n'etoit pas entierement cicatrisee, l'autre etant tout a fait guerie. je lui recommandai le repos pendant quelque tems.

au mois de decembre 1784, on m'ecrivit que m. martin se trouvoit dans le meme etat ou je l'avois vu dix neuf ans — auparavant et qu'il me prioit instamment d'aller a son secours. je trouvai sa cuisse tumefiee dans toute son etendue, l'enflure s'etendoit meme jusques au dessous du tiers superieur de la jambe — sa maladie avoit ete traitee dans le commencement pour une douleur rhumatismale, le n'etoit que depuis peu de jours que la tumefaction de la partie avoit determine le medecin qui le voyoit, a y faire appliquer un cataplasme evolvant et a le faire saigner deux fois. ayant interroge le malade, il me dit qu'il n'avoit point fait de chute, mais qu'il avoit fait des efforts considerables, pour eviter de tomber, sa jambe s'etant enfoncée a l'improviste dans un petit fosse, en marchant dans la campagne pendant une nuit pluvieuse et obscure, et que ses douleurs avoient commence a peu pres a cette époque.

ce rapport me persuada que dans les mouvemens violens et
inusités que m. martin avoit été obligé de faire, il s'étoit fait
un déchirement de plusieurs fibres et qu'il y avoit eu quelques
petits vaisseaux rompus, lequel avoit été suivi de douleur, —
d'inflammation et de suppuration. Le déchirement et cette
rupture me parurent très vraisemblables, dans une partie dont
l'organisation avoit souffert beaucoup de changement.
un peu d'edemae dans le voisinage des cicatrices me
confirma dans mon opinion et me fit juger une
collection de pus, dont je ne pouvois pas m'assurer par la
fluctuation, parce qu'il étoit placé au-dessous de l'aponévrose
fascia lata et au-dessous de cicatrices dures et épaisses aux
endroits où cette aponévrose avoit été détruite. Je plongeai
un bistouri dans le voisinage de l'ancienne incision superficielle,
et je donnai issue à une quantité prodigieuse d'un pus
sanieux; Le doigt que j'introduisis dans la plaie entraîna
au-dehors beaucoup de grumeaux de sang noirâtre à
demi desséché; je trouvais un délabrement très considérable
produit par la destruction de presque tout le tissu cellulaire
qui étoit entre les muscles qui recouvrent le fémur, et je

trouvai de relief l'os dénudé dans une étendue assez grande
à l'endroit de la suture des deux pièces osseuses. encouragé
par le succès obtenu en 1765, j'en conduisis de la même manière;
je fis une contre ouverture à la partie inférieure et externe
de la cuisse; je pansai de manière à favoriser l'évacuation du
pus; je fis des injections avec la decoction de quinquina et de
fleur de Camomille, aux deux autres premiers pansements;
j'administrai intérieurement le quinquina; j'employai un
appareil compressif et expulif, et pour éviter l'inconvénient
des pansements peu méthodiques, je fis venir de Toulon avant de
quitter le malade, un élève de confiance qui seconda mes vues;
je retournai encore une fois à la Citadelle pendant le traitement;
j'y fis quelque séjour et j'obtins un succès aussi complet qu'en
1765.

La D^{lle} Olivier eut un dépôt derrière et au dessus de
l'oreille gauche, précédé de cruelles douleurs, je le touai, je
trouvai le périoste détaché dans une assez grande étendue
la plaie guérit en peu de temps sans exfoliation, par des
pansements compressifs.

a Toulon le 3^e 7^{bre} 1767. Marné



